



SALVAVIDAS: INTOXICACIONES

Prácticas de primeros auxilios en la empresa

SÍNTOMAS



VÍA ORAL

- Náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal.
- Dificultad en la respiración.
- Alteraciones de la consciencia.
- Convulsiones.

VÍA CUTÁNEA

- Náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal.
- Dificultad en la respiración.
- Alteraciones de la consciencia.
- Convulsiones.

ACTUACIÓN

1. Separar a la víctima de la fuente tóxica.
2. Identificar y anotar el tóxico.
3. Consultar con el Centro de Información Toxicológica (915 620 420).
4. Consultar si existe la ficha de datos de seguridad.

- Si está consciente, hacerle beber agua con sal y provocar el vómito.
- Traslado a un centro sanitario

NO PROVOCAR EL VÓMITO SI:

1. El afectado está inconsciente o presenta convulsiones.
2. Si ha ingerido productos cáusticos (lejía) o derivados del petróleo.
3. En caso de embarazo.

1. Desvestir a la víctima.
2. Limpiar la zona afectada con agua.
3. Traslado a un centro sanitario

RECUERDA

no provocar el vómito si el afectado inconsciente presenta convulsiones, ha ingerido lejía o productos derivados del petróleo o está en estado de embarazo.



SÍGUEMOS EN



mutuabalear.es cuidamostusalud.org
elautonomo.es tresminutos.es

MUTUA BALEAR

Área de seguridad e higiene en el trabajo



PLAN GENERAL
DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL